

การแพร่กระจายของ *Salmonella* ในเนื้อหมู

(Prevalence of *Salmonella* in Pork)

พกามาศ ลีวะทินแสนสุข และ สุดาษัยชล หอมทอง*

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

Phakamas Leewatinsansuk and Sudsaichon Homthong*

Department of Microbiology, Faculty of Science, Burapha University, Chonburi 20131

บทคัดย่อ

การศึกษาการแพร่กระจายของ *Salmonella* ในเนื้อหมูและหมูบด จำนวน 60 ตัวอย่าง ที่จำหน่ายในตลาดสด หนองมนและตลาดนัดหลังมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2549 พนการปนเปื้อนของ *Salmonella* จากตัวอย่างเนื้อหมูและเนื้อหมูบด 18 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 30.0 ของตัวอย่างทั้งหมด โดยเนื้อหมู ตรวจพบเชื้อร้อยละ 23.3 (7/30) และในเนื้อหมูบดพบร้อยละ 36.7 (11/30) และพบว่ามีการแพร่กระจายของ *Salmonella* รวม 8 ซีโรวาร์ โดยพนการปนเปื้อนของ *S. Anatum* (7) มากที่สุด รองลงมาได้แก่ *S. Stanley* (3), *S. Albany* (2), *S. Derby* (2), *S. Agona* (1), *S. Typhimurium* (1), *S. 1, 4, 12 : i :-* (1) และ *S. 6, 7 :-* (1) ตามลำดับ การศึกษา ในครั้งนี้พนการแพร่กระจายของ *Salmonella* ในเนื้อหมูและเนื้อหมูบดจากตลาดสดหนองมนและตลาดนัด ในจังหวัด ชลบุรี ตั้งนั้นจึงควรเลือกวิธีปฐุงเนื้อสัตว์ให้เหมาะสมก่อนที่จะบริโภคและควรเพิ่มมาตรการรักษาความสะอาดใน ขั้นตอนการผลิตเนื้อสัตว์จากฟาร์มจนถึงผู้บริโภคเพื่อช่วยผู้บริโภคปลอดภัยจากการบริโภค *Salmonella* จากเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ได้

คำสำคัญ : *Salmonella* เนื้อหมู

Abstract

The prevalence of *Salmonella* in pork and minced pork collected from the Nongmon market and the local market near Burapha University, Chonburi Province, was conducted from September to November, 2006. A total of 60 samples (30 pork and 30 minced pork) was examined, 18 samples (30.0%) were found *Salmonella* positive. Among these positive samples, 23.3% (7/30) were detected in pork and 36.7% (11/30) were detected in minced pork samples. The *Salmonella* isolates were *S. Anatum* (7), *S. Stanley* (3), *S. Albany* (2), *S. Derby* (2), *S. Agona* (1), *S. Typhimurium* (1), *S. 1, 4, 12 : i : -* (1) and *S. 6, 7 : : -* (1), respectively. Results of this study indicate that *Salmonellae* are widely spread in pork and minced pork samples obtained from the Nongmon and the local markets in Chonburi. Proper cooking of meat and improving of personal and meat hygiene in the meat production lines from farm to fork should be adopted to ensure the safety of meat and meat products for human comsumption.

Keywords : *Salmonella*, Pork

บทนำ

ในช่วงระยะเวลา 10-15 ปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการรับประทานอาหารเป็นจำนวนมาก สาเหตุของการเกิดโรคเหล่านี้เกิดจากแบคทีเรียหลายชนิด ที่สำคัญได้แก่ *Salmonella* เนื่องจาก *Salmonella* เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษที่มีความรุนแรงอย่างมาก (สุมณฑา วัฒนลินธุ์, 2545) นอกจากเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษระบาดลุกเป็นอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษและในอีกหลาย ๆ ประเทศแล้ว (European Commission, 2000) ยังทำให้ประชากรมีโอกาสเสียชีวิตสูง ซึ่งในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก โดยได้กำหนดเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเป็นนโยบายหลักในการก้าวไปสู่เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อยู่บัดการณ์ของโรคอาหารเป็นพิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเชื้อจุลทรรศน์ยังคงสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโรคที่มีการเฝ้าระวังในประเทศไทย โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคพบว่า ในปี พ.ศ. 2548 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจากเครือข่ายทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 140,949 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 226.62 ต่อประชากรแสนคน และพบว่าเป็นผู้ป่วยจากการติดเชื้อ *Salmonella* spp. 219 ราย (วรรณษา หาญเชาว์รากุล และคณะ, 2548)

โดยปกติแล้ว *Salmonella* มีแหล่งที่พนอยู่ในลำไส้หรือทางเดินอาหารของมนุษย์และสัตว์หลายชนิด นอกจากนี้เชื้อสามารถแพร่กระจายไปกับอุจจาระ น้ำ และสิ่งแวดล้อมได้ (Axelsson and Sorin, 1997) และยังมีโอกาสบันเป็นในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะในเนื้อหมู ซึ่งมีรายงานว่า พบรการบันเป็นของ *Salmonella* ตั้งแต่ร้อยละ 7-88 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวบ่งเนื้อหมูที่นำมาตรวจ (พิทักษ์ น้อยเมล์ และคณะ, 2548; อดิคร เสวตวิวัฒน์ และคณะ, 2548; Chau et al., 1977) และถ้ามีการเพิ่มพื้นที่

ผิวนอก เช่น การบดจะทำให้มีโอกาสพบรการบันเป็นสูงขึ้น (สุมาลี เหลืองสกุล, 2541) ดังนั้นถ้ามีการนำเนื้อหมู และเนื้อหมูบดมาเป็นอาหาร ก็อาจจะทำให้เกิดการบันเป็นข้ามหรือเกิดการแพร่กระจายของ *Salmonella* ไปในอาหาร และสิ่งสัมผัสกับอาหารต่างๆ ได้โดยง่าย ซึ่งการบันเป็นเหล่านี้สามารถเกิดได้ในหลายชั้นตอนการผลิต ทั้งในวัตถุต้น กระบวนการผลิต การเก็บรักษา การจำหน่าย ตลอดจนการป้องกันและการบริโภค การศึกษาในครั้งนี้ จึงได้มุ่งเน้นที่จะศึกษาการแพร่กระจายของ *Salmonella* จากตัวอย่างเนื้อหมู และเนื้อหมูบดที่จำหน่ายในตลาดสด และตลาดนัด ซึ่งจะช่วยทำให้ทราบถึงอัตราการบันเป็นของ *Salmonella* อันจะเป็นประโยชน์ต่อการหาวิธีป้องกันการระบาดของเชื้อโรคชนิดนี้ได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

1. ตัวอย่างเนื้อหมู

เนื้อหมูและเนื้อหมูบดที่ขายในตลาดสดหนองมน และตลาดนัดหลังมหาวิทยาลัยบูรพาจำนวน 6 ร้าน แบ่งเป็นตลาดสดหนองมน 3 ร้าน และตลาดนัดหลังมหาวิทยาลัยบูรพา 3 ร้าน เก็บตัวอย่างทั้งหมด 60 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 200 กรัม โดยแบ่งเป็นเนื้อหมู 30 ตัวอย่าง และเนื้อหมูบด 30 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนกันยายน-พฤษจิกายน พ.ศ. 2549

2. การแยกเชื้อจากตัวอย่าง (ดัดแปลงมาจากรายงานของ Mrema et al., 2006)

2.1 ตัวอย่างเนื้อหมูหรือเนื้อหมูบดอย่างละ 25 กรัม ใส่ในถุงพลาสติกปิดอดเชื้อ เดิม Buffered Peptone Water (BPW) 225 มิลลิลิตร ลงไปบ่มท่ออุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง

2.2 ถ่ายเชื้อจาก BPW 1 มิลลิลิตร ลง Selenite cystine broth (SC) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร บ่มท่ออุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส นาน 18-24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มจำนวนเชื้อ

2.3 นำตัวอย่างจากข้อ 2.2 มาเพาะเชื้อลบบนอาหาร Xylose lysine desoxycholate agar (XLD) และ Bismuth sulfite agar (BSA) โดยขัดแยกเชื้อให้ได้โคโลนีเดี่ยว บ่อมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง (โคโลนีที่คาดว่าเป็น *Salmonella* จากอาหารเลี้ยงเชื้อ XLD จะมีโคโลนีสีแดงมีจุดสีดำตรงกลางโคโลนีหรือไม่มี และใน BSA จะมีโคโลนีสีดำ น้ำตาล หรือเทา อาจมีเงาโลหะหรือไม่มีรอนโคโลนีสีดำเมื่อบ่มไว้นาน)

2.4 เลือกโคโลนีอย่างน้อย 3 โคโลนีในแต่ละอาหาร ที่คาดว่าเป็น *Salmonella* จากอาหารเลี้ยงเชื้อในข้อ 2.3 มาเลี้ยงบนอาหาร Tryptic soy agar (TSA) เพื่อนำมาทดสอบสมบัติทางชีวเคมีและทดสอบการเกะกะกลุ่มกับแอนติซีรัมต่อ *Salmonella* โดยวิธี slide agglutination ต่อไป

3. การทดสอบสมบัติทางชีวเคมีของ *Salmonella*

นำเชื้อที่ได้แยกบริสุทธิ์มาทดสอบด้วยการย้อมสีแกรมและทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมีเพื่อยืนยันว่าเป็น *Salmonella* ตามวิธีของ Koneman et al. (1994) และ Forbes et al. (2002) โดยทดสอบด้วย Triple sugar iron agar (TSI), Lysine iron agar (LIA), Indole, Urea agar, Simmons citrate agar และทดสอบการเคลื่อนที่ในอาหาร Motile test medium โดยมีเชื้อ *Salmonella Enteritidis* DMST 15676 เป็นเชื้อมาตรฐานสำหรับใช้เป็นชุดควบคุมในการทดสอบสมบัติทางชีวเคมี

4. การทดสอบการเกะกะกลุ่มกับแอนติซีรัม (Slide Agglutination Test)

หยดน้ำเกลือลงที่ปลายแต่ละข้างของสไลด์ จุ่ดละ 1 หยด และใช้วัดเขี้ยวเชื้อที่ปลอกเชื้อเขี้ยวเชื้อจาก TSA นำมากระจายในหยดน้ำเกลือที่จุ่ดหนึ่ง ผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นหยดแอนติซีรัมต่อ *Salmonella* 1 หยด ลงในน้ำเกลือแต่ละจุด เอียงสไลด์ไปมาเบาๆ ลังเกตการณ์เกิดตะ gon ละเอียดของส่วนผสมที่มีน้ำเกลือ แบคทีเรียและแอนติซีรัม (ส่วนผสม 1) และส่วนผสมที่มีน้ำเกลือและแอนติซีรัม (ส่วนผสม 2) การอ่านผลของการทดสอบ

นั้นถ้าส่วนผสม 1 เกิดตะ gon ภายใน 1 นาที และส่วนผสม 2 ไม่เกิดตะ gon (ตะ gon มีลักษณะละเอียด ส่วนน้ำใส) แสดงว่าให้ผลลบกับการทดสอบ ถ้าส่วนผสม 1 และส่วนผสม 2 ไม่เกิดตะ gon แสดงว่าให้ผลลบกับการทดสอบ และถ้าส่วนผสมทั้ง 2 เกิดตะ gon ต้องทำการทดสอบทางชีวเคมีและทางชีวเคมีเพิ่มเติมต่อไป (ศิริโฉม ทุ่งเก้า. 2548)

5. การจัดจำแนกเป็นชีโรوار์

นำเชื้อบริสุทธิ์ส่งให้สถาบันวิจัยสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ฝ่าย WHO National *Salmonella* and *Shigella* Center) ได้ทดสอบยืนยันและจัดจำแนกเป็นชีโรوار์ต่อไปซึ่งการทดสอบจะใช้ O-antiseraum และ H-antiseraum ของ *Salmonella* ที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล

1. *Salmonella* ในเนื้อหมูและเนื้อหมูบด

จากการศึกษาการแพร์กรายของ *Salmonella* ในเนื้อหมูและเนื้อหมูบด 60 ตัวอย่าง พบร่วมกับการปนเปื้อนของ *Salmonella* ทั้งหมด 18 ตัวอย่าง (ร้อยละ 30.0) โดยพบในเนื้อหมู 7 ตัวอย่าง (ร้อยละ 23.3) และในเนื้อหมูบด 11 ตัวอย่าง (ร้อยละ 36.7) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 *Salmonella* ที่แยกได้จากเนื้อหมูและเนื้อหมูบด จากตลาดสดหนองมนและตลาดนัดหลังมหาวิทยาลัยนูรพา จังหวัดชลบุรี

ชนิดตัวอย่าง	จำนวนตัวอย่าง	ตัวอย่างที่พบ
		<i>Salmonella</i> (ร้อยละ)
เนื้อหมู	30	30
เนื้อหมูบด	30	30
รวม	60	60

ซึ่งจากการทดลองที่พพ *Salmonella* ในเนื้อหมูนี้สอดคล้องกับรายงานของอรุณบ่างตรากุลนนท์ และคณะ (2537) ซึ่งพบเชื้อ *Salmonella* จากตัวอย่างเนื้อหมูซึ่งเก็บจากตลาดในจังหวัดชลบุรีคิดเป็นร้อยละ 45 รวมทั้งสอดคล้องกับรายงานของ อดิสรา เสวตวิชิตานัน และคณะ (2548) ซึ่งตรวจพบเชื้อ *Salmonella* ในตัวอย่างหมูเนื้อ สันสดที่จำหน่ายในตลาดและห้างสรรพสินค้าของบริเวณเขตตลาดกระบัง นนทบุรี และปทุมธานีโดยพนธิร้อยละ 88 และสอดคล้องกับรายงานของ Ejeta et al. (2004) ที่ได้ศึกษาการแพร่กระจายของ *Salmonella* ในเนื้อหมูจากชุมป์เบอร์มาเก็ต 24 แห่ง ในเมือง Addis Ababa พนการปนเปื้อนของ *Salmonella* คิดเป็นร้อยละ 16.4 ซึ่งสาเหตุของการปนเปื้อนดังกล่าว อาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น โรงฆ่าสัตว์ไม่ได้มาตรฐาน การชำแหละไม่ถูกสุขลักษณะ การเก็บรักษาที่ไม่สะอาดหรือเก็บในอุณหภูมิไม่เหมาะสม สิ่งแวดล้อมภายในโรงฆ่าสัตว์ไม่ดี รวมทั้งความเป็นไปได้ที่ตัวสัตว์เองเป็นพาหะของเชื้อโดยตรง (ชิต ศิริวรรณ และคณะ, 2539; Motsoela et al., 2002) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของประภาส (2546) ที่พบว่า ความชุกของการติดเชื้อ *Salmonella* spp. ของสุกรในโรงฆ่าสัตว์ (ร้อยละ 80.5) ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จากระดับฟาร์ม (ร้อยละ 50-83.3) ซึ่งเป็นผลมาจากการติดเชื้อข้ามในระหว่างการขนส่ง และความเครียดในช่วงระหว่างก่อนการฆ่า และพนเชื้อ *Salmonella* spp. จากการ swab ชา gek ร้อยละ 53.2 ซึ่งเกิดจากการขาดสุขอนามัยที่ดีในกระบวนการฆ่า สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศเบลเยียมของ Botteldoorn et al. (2003) ซึ่งตรวจพน *Salmonella* spp. ร้อยละ 37 จากชาสุกร พบว่าความแตกต่างของการตรวจพนเชื้อเนื้อค่อนข้างกว้าง (ร้อยละ 0-70) ขึ้นกับสุขอนามัยของโรงฆ่า การขนส่ง สุกรมีชีวิตและลิ้งแวดล้อมของโรงฆ่า และยังสอดคล้องกับรายงานของพิทักษ์ น้อยเมล์ และคณะ (2548) ซึ่งได้เก็บตัวอย่างเนื้อจากชาสุกรจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครขอนแก่นซึ่งเป็นโรงฆ่าสัตว์แบบไม่ใช้ระบบแขวน และ

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเลยซึ่งใช้ระบบแขวน จำนวน 200 ตัวอย่าง พนว่าเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเลย ตรวจพน *Salmonella* ร้อยละ 7 ซึ่งน้อยกว่าโรงงานฆ่าสัตว์เทศบาลนครขอนแก่นที่ตรวจพน *Salmonella* ร้อยละ 41 แสดงให้เห็นว่าการใช้ระบบแขวนในโรงฆ่าสัตว์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลไปลดปริมาณการตรวจพน *Salmonella* ในเนื้อสุกร จากการทดลองนี้เมื่อเปรียบเทียบในเนื้อหมู และเนื้อหมูบด พนว่าในเนื้อหมูบดมีแนวโน้มพน *Salmonella* ได้มากกว่าเนื้อหมูทั้งนี้เนื่องจากหมูบดต้องผ่านกระบวนการตัดเป็นชิ้นเล็กมีพื้นที่ผิวมากเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสูง (Tegegne & Ashenafi, 1998) เมื่อจำแนกตามสถานที่เก็บตัวอย่าง พนว่า *Salmonella* ที่แยกได้จากตัวอย่างเนื้อหมูและเนื้อหมูบดจากตลาดสดหนองมน และตลาดนัดหลังมหาวิทยาลัยบูรพา มีการปนเปื้อนจำนวน 9 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 30 ซึ่งไม่แตกต่างกัน แสดงได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 *Salmonella* ที่แยกได้จากเนื้อหมูและเนื้อหมูบดจากตลาดสดหนองมน และตลาดนัดหลังมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

แหล่งเก็บตัวอย่าง	เนื้อหมู		เนื้อหมูบด		รวม
	Total	Positive	Total	Positive	
ตลาดนัดหลัง	15	4	15	5	30 9 (30.0)
มหาวิทยาลัยบูรพา	15	3	15	6	30 9 (30.0)
ตลาดสดหนองมน	15	3	15	6	30 9 (30.0)
รวม	30	7	30	11	60 18 (30.0)

โดยจากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า แรงจำหน่ายที่นำไปให้ความสนใจต่อความสะอาดน้อย และลิ้งแวดล้อมรอบแพง เช่นการขายเครื่องในปนกันชื้นเนื้อ การตัดแบ่งໄล์หมูด้วยมีด เขียงเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของเนตรนภัส ธนนิเวศน์กุล และคณะ (2548) ที่พน *Salmonella* spp. ในเนื้อหมู เขียง มีด และมีอุปกรณ์จำหน่าย คิดเป็นร้อยละ 89, 84, 81 และ 75 ตามลำดับ จากรายงานการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการปนเปื้อน

ของ *Salmonella* ในเนื้อหมูหรือเนื้อหมูบดนั้นอาจเกิดได้ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงถึงแหล่งจำหน่าย ซึ่งมักพบได้เป็นประจำ เช่นการนำเนื้อหมูชำแหละใส่รับบรรทุกออกจากโรงชำแหละไปส่งตามตลาด หรือใส่เขียงบรรทุกห้าม

รถจักรยานยนต์ส่งไปตามตลาดขายปลีกโดยมีได้มีอะไรปกปิดเนื้อหมูเลย ผู้จำหน่ายเนื้อหมูก็อาจเป็นแหล่งของการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ หากผู้จำหน่ายไม่มีความรู้ทางด้านการสุขาภิบาลหรือรู้ไม่ดีพอ มือของผู้จำหน่ายหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่ใช้สัมผัสอาหารในขณะจำหน่ายซึ่งการสัมผัสอาหารหลายชนิดโดยมิได้ล้างมือก็อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์จากอาหารชนิดหนึ่งได้ตั้งนั้นจึงควรมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ฟาร์ม โรงฆ่าและช่วงการขนส่งจากโรงฆ่าหรือสถานที่ชำแหละมาสู่ผู้จำหน่าย รวมถึงการรักษาความสะอาดของแผงจำหน่ายหลังการจำหน่ายในแต่ละวัน และควรให้ความรู้ทางด้านสุขาภิบาลส่วนบุคคลที่ดีแก่ผู้จำหน่ายประจําแผงจากหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

2. การทดสอบทางชีวุรุ่ววิทยา

อย่างไรก็ตามแม้จะสามารถแยก *Salmonella* จากตัวอย่างเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ ได้แล้ว แต่การประเมินถึง

ตารางที่ 3 ชีโร瓦ร์ของ *Salmonella* ที่แยกได้จากเนื้อหมู และเนื้อหมูบด บริเวณตลาดนัดหลังมหาวิทยาลัยบูรพาและตลาดสดหนองมน จังหวัดชลบุรี

ชีโร瓦ร์	ชนิดของตัวอย่าง		รวมไอโซเลท (ร้อยละ)
	เนื้อหมูบด (ร้อยละ)	เนื้อหมู (ร้อยละ)	
<i>S. Anatum</i>	4 (36.4)	3 (42.9)	7 (38.9)
<i>S. Stanley</i>	1 (9.1)	2 (28.6)	3 (16.7)
<i>S. Albany</i>	1 (9.1)	1 (14.3)	2 (11.1)
<i>S. Agona</i>	1 (9.1)	-	1 (5.6)
<i>S. Typhimurium</i>	1 (9.1)	-	1 (5.6)
<i>S. Derby</i>	1 (9.1)	1 (14.3)	2 (11.1)
<i>S. 1, 4, 12 :-</i>	1 (9.1)	-	1 (5.6)
<i>S. 6, 7 :-</i>	1 (9.1)	-	1 (5.6)
รวม	11 (61.1)	7 (38.9)	18 (100)

หมายเหตุ; หมายถึง ไม่พบ

ความรุนแรงของการก่อโรคนั้นจะต้องทราบว่า *Salmonella* ที่แยกได้เป็น *Salmonella* สายพันธุ์อะไร เพราะถึงแม้ว่าทุกสายพันธุ์ของเชื้อ *Salmonella* จะทำให้เกิดโรคในคนได้แต่ความรุนแรงของการก่อโรคจะแตกต่างกันไปแล้วแต่สายพันธุ์ (Acha & Szyfres, 2001) นอกจากนี้การทราบสายพันธุ์ของเชื้อยังเป็นข้อมูลที่ดีในการระบาดของโรคจาก *Salmonella* ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องอีกด้วย จากการศึกษานี้ได้ส่ง *Salmonella* จำนวน 18 ไอโซเลท ที่แยกได้จากตัวอย่างเนื้อหมูและเนื้อหมูบดให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ฝ่าย WHO National *Salmonella* and *Shigella* Center) เพื่อทดสอบยืนยันและจัดจำแนกเป็นชีโร瓦ร์ ชีโร瓦ร์ที่พบมากที่สุด คือ *S. Anatum* จำนวน 7 ไอโซเลท (ร้อยละ 38.9) รองลงมาคือ *S. Stanley* จำนวน 3 ไอโซเลท (ร้อยละ 16.7), *S. Albany* และ *S. Derby* พบชีโร瓦ร์ละ 2 ไอโซเลท (ร้อยละ 11.1) และ *S. Agona*, *S.Typhimurium*, *S. 1, 4, 12 :-*, *S. 6, 7 :-* พบรอยละ 1 ไอโซเลท (ร้อยละ 5.6) ตามลำดับ (ตารางที่ 3)

ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับรายงานของ สุมาลี บุญมา และคณะ (2540) ที่พับการปนเปื้อนของ *S. Anatum* และ *S. Derby* ในตัวอย่างเนื้อหมู เช่นเดียวกับ อดิศร เสวตวิวัฒน์ และคณะ (2548) ที่พับ *S. Anatum* มากที่สุด ในตัวอย่างหมูเนื้อสันสต์ที่จำหน่ายในตลาดและห้างสรรพสินค้าของบริเวณเขตตลาดกระบัง นนทบุรีและปทุมธานี รวมทั้งสอดคล้องกับรายงานของ Angkitirakul et al. (2005) ที่พับ *S. Stanley* ในเนื้อหมูจากตลาดนัดจังหวัดขอนแก่น สำหรับรายงานการศึกษาในต่างประเทศนั้นก็ให้ผลสอดคล้องเช่นเดียวกันโดยรายงานของ Chau et al. (1977) ที่พับการปนเปื้อนของ *S. Anatum* และ *S. Derby* จากชาガสุกรในช่องกง รายงานการศึกษาในประเทศไทยเดียวกับ Kalimuddin-Choudhary (1999) ที่พับ *S. Agona* ในเนื้อหมู รายงานการศึกษาในประเทศไทยเม็กซิโกของ Escartina et al. (2000) ที่พับการปนเปื้อนของ *S. Agona*, *S. Typhimurium*, *S. Derby* และ *S. Anatum* ในเนื้อหมู รายงานการศึกษาในประเทศไทยเนเธอร์แลนด์ของ Swanenburg et al. (2001) พบ *S. Typhimurium*, *S. Derby* และ *S. Anatum* ในสุกรและสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งเป็นการยืนยันว่า การปนเปื้อนนั้นอาจมาจากการสิ่งแวดล้อม รายงานการศึกษาในประเทศไทยเดียวกับ Phan et al. (2005) ที่พับ *S. Derby* ปนเปื้อนในตัวอย่างเนื้อหมู และรายงานการศึกษาในประเทศไทยของ Bahnhson et al. (2006) พบการปนเปื้อนของ *S. Agona*, *S. Typhimurium* และ *S. Derby* ในตัวอย่างที่เก็บจากฟาร์มเลี้ยง และที่โรงฆ่าสัตว์ ซึ่งชี้ยวาระที่พับในการศึกษานี้จัดอยู่ในกลุ่มที่มีได้จำเพาะต่อชนิดโถสต์ เป็นกลุ่มของ *Salmonella* spp. ที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหารอักเสบ หรือ gastroenteritis *Salmonella* spp. เนื่องจากความสามารถในการดำรงชีวิตอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมได้เป็นผลให้ *Salmonella* spp. กลุ่มนี้สามารถแพร่กระจายไปในสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือแม้กระทั่งคนและตัวสัตว์ได้ จึงพบว่า *Salmonella* spp. สามารถแพร่กระจายในห่วงโซ่อหารา

ได้อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ในการควบคุม อุบัติการณ์ของโรคที่เกิดจาก *Salmonella* spp. ในอาหารทำให้เกิดอาการของโรคอาหารเป็นพิษที่เรียกว่า ชัลโมเนลโลซีส (*Salmonellosis*) (Jay, 2000) ซึ่งจากรายงานของ FAO/WHO (2002) พบว่า *Salmonella* สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคชัลโมเนลโลซีส มากที่สุด ได้แก่ *S. Enteritidis* และรองลงมาดือ *S. Typhimurium* แต่ในประเทศไทยพบว่า *S. Welteverden* เป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในคนและสัตว์ได้มากกว่าสองสายพันธุ์ดังกล่าว (Bangtrakulnonth et al., 2004) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พบ *S. Typhimurium* ในตัวอย่างหมูสด ซึ่งจากรายงานผลการตรวจเคราะห์ครั้งนี้ น่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นทำให้ทราบถึงอุบัติการณ์การปนเปื้อนของเชื้อ *Salmonella* ในเนื้อหมูเพื่อเป็นประโยชน์ ในเบื้องของการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อต่อไปได้ ดังนั้นถ้าต้องการบริโภคน้ำเนื้อหมูและเนื้อหมูสด ควรบริโภคเฉพาะเนื้อหมูที่ปรุงสุกอย่างทั่วถึงแล้วเท่านั้น อาจทำโดยการต้มให้สุกจนเดือด (100 องศาเซลเซียส) หรือการปั้งหรือย่างด้วยไฟจนมีอุณหภูมิภายในก้อนเนื้อหรือชิ้นเนื้อ อย่างน้อย 60-70 องศาเซลเซียส และไม่ควรบริโภคเนื้อหมูแบบดิบๆ หรือสุกๆ ดิบๆ ทั้งนี้เพื่อการป้องกันตนเองจากโรคภัยที่อาจเกิดจากการบริโภคเนื้อหมูที่มีเชื้อ *Salmonella* ปนเปื้อนอยู่และไม่ได้ผ่านการปรุงอย่างเหมาะสม รวมทั้งผู้จำหน่ายเนื้อหมูเองก็ต้องระวังการปนเปื้อนของ *Salmonella* ข้ามจากเนื้อหมูไปสู่มืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สัมผัสอาหารที่ผู้จำหน่ายใช้เองด้วย

สรุป

การศึกษาการแพร่กระจายของ *Salmonella* ในเนื้อหมูและเนื้อหมูสด ที่จำหน่ายในตลาดนัดหลังมหาวิทยาลัยบูรพาและตลาดสดหนองมน จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนพฤษจิกายน 2549 รวมจำนวน 60 ตัวอย่าง แบ่งเป็นเนื้อหมู 30 ตัวอย่าง และเนื้อหมูสด 30 ตัวอย่าง ผลการทดลองพบการปนเปื้อนของ *Salmonella*

จากเนื้อหมูและเนื้อหมูดจำนวน 18 ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ 30 จากตัวอย่างทั้งหมด โดยแยกได้จากเนื้อหมู 7 ไอโซเลท (ตัวอย่าง) คิดเป็นร้อยละ 23.3 และในเนื้อหมูด 11 ไอโซเลท (ตัวอย่าง) คิดเป็นร้อยละ 36.7 และเมื่อนำ *Salmonella* ทั้ง 18 ไอโซเลท ที่แยกได้ไปทดสอบยืนยัน และจัดจำแนกเป็นซีโรวาร์ โดยสถาบันวิจัยสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ฝ่าย WHO National *Salmonella* and *Shigella* Center) ซีโรวาร์ที่พบมากที่สุด คือ *S. Anatum* จำนวน 7 ไอโซเลท (ร้อยละ 38.9) รองลงมาคือ *S. Stanley* จำนวน 3 ไอโซเลท (ร้อยละ 16.7), *S. Albany* และ *S. Derby* พนซีโรวาร์ละ 2 ไอโซเลท (ร้อยละ 11.1) และ *S. Agona*, *S. Typhimurium*, *S. 1, 4, 12 : i :-* และ *S. 6, 7 :-:-* พนซีโรวาร์ละ 1 ไอโซเลท (ร้อยละ 5.6) ตามลำดับ

เอกสารอ้างอิง

- ชิต ศิริวรรณ, กัญญา อายาหยุทธ, เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ และพัชรา เพือกເກດ. (2539).โรค *Salmonellosis* จากสุกรสุคน. ใน เอกสารการประชุมทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขา สัตว์แพทยศาสตร์ (หน้า 419-423). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- เนตรนภิส ธันนิเวศน์กุล, เรณุ ทวีชาติวิทยากุล, นฤมล ปันประไฟ และอังคารศิริ ดีอ้วม. (2548). การศึกษาสถานการณ์การขนส่ง การจำหน่ายและการวิจัยรูปแบบการจัดการความปลอดภัยในเนื้อหมูในชั้ntonการวางแผนจำหน่าย : ในตลาดสด. สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ประภาส พัชนี. (2546). การติดตามตรวจสอบเชื้อชัลโมเนลลาของสุกรในโรงฆ่าสัตว์ จังหวัด เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหบันฑิต. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, มหาวิทยาลัย เชียงใหม่.

พิทักษ์ น้อยเมล, สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ และภารภรณ์ ศุกลพงศ์. (2548). การตรวจหาเชื้อชัลโมเนลล่า ในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครขอนแก่น และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเลย. วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มช. 15 (1), 54-59.

วรรณ หาญเชาว์วรกุล, ดารินทร์ อารีย์โชคชัย, สุชาดา จันทลิริยาร. กลมชนก เทพลิทวา, นวรรรณ ดิเรกโกค, สุทธนันท์ สุทธชนะ, อุบลรัตน์ นฤพนธ์ จริกุล, ออมรา ทองคงชัย, ชยุภา สาดสูงเนิน และ สำเริง ภู่ระหงษ์.(2548). รายงานการสอบสวน โรคอาหารเป็นพิษ ประจำปี 2548. กรุงเทพฯ: กลุ่ม เฝ้าระวังและสอบสวนโรค สำนักงานคณะกรรมการควบคุมโรค.

ศิริโจน ทุ่งเก้า. (2548). ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร. ชลบุรี: ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

สมณทา วัฒนลินธุ. (2545). จุลชีววิทยาทางอาหาร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สุมาลี บุญมา, นพรัตน์ หมายริม, ศรีรัตน์ พรเรืองวงศ์ และอรุณ บ่างตระกุลนันท์. (2540). การศึกษา การปนเปื้อนของเชื้อชัลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์ จากเนื้อไก่และเนื้อหมู. วารสารเกษตรศาสตร์. 31, 413-418.

สุมาลี เหลืองสกุล. (2541). จุลชีววิทยาทางอาหาร. (พิมพ์ ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

อดิศร เสนตวิวัฒน์, วรรณา ครุสิ่ง, ศรีรัตน์ พรเรืองวงศ์ และอรุณ บ่างตระกุลนันท์. (2548). เปรียบเทียบ อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อในชั้nton selective enrichment และ isolation ในการตรวจหาเชื้อชัลโมเนลลาในเนื้อหมูสดจำหน่ายปลีก. วารสาร เกษตรพระจอมเกล้า. 23, 1-13.

- อรุณ ป่างตระกูลนนท์, สุมาลี บุญมา, นพรัตน์ หมายริม, สุพล เลื่องยศลือชาภุกุล, จตุรงค์ สุตัณฑ์วินัย และ มยุรา กุสุมงก. (2537). การศึกษาโรค Salmonellosis จากสุกรในประเทศไทย. ใน เอกสารการประชุม วิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรุงเทพฯ.
- Acha, P.N., & Szyfres, B. (2001). *Salmonellosis in zoonosis and communicable diseases common to man and animal*. Pan american health organization. Washington, DC.: Scientific and Technical Publication No. 580.
- Angkititrakul, S., Chomvarin, C., Chaita, T., Kanistanon, K., & Waethewutajarn, S. (2005). Epidemiology of antimicrobial resistance in *Salmonella* isolated from pork, chicken meat and humans in Thailand. *Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health*, 36(6), 1510-1515.
- Axelsson, F., & Sorin, M.L. (1997). *Transia Salmonella technical handbook*. Sweden: Diffchamb.
- Bangtrakulnonth, A., Pornreongwong, S., Pulsrikarn, C., Sawanpanyalert, P., Hendriksen, R.S. & Aarestrup, F.M. (2004). *Salmonella* serovars from human and other sources in Thailand. *Emerging Infectious Diseases*, 10(1), 1993-2002.
- Bahnsen, P.B., Fedorka-Cray, P.J., Ladely, S.R., & Mateus-Pinilla, N.E. (2006). Herd-level risk factors for *Salmonella enterica* subsp. *enterica* in U.S. market pigs. *Preventive Veterinary Medicine*, 76, 249–262.
- Botteldoorn, N., Heyndrickx, M., Rijpens, N., Grijseels, K., & Herman, L. (2003). *Salmonella* on pig carcasses: positive pigs and cross contamination in the slaughterhouse. *Journal of Applied Microbiology*, 95, 891-903.
- Chau, P.Y., Shortridge, K.F., & Huang, C.T. (1977). *Salmonella* in pig carcasses for human consumption in Hong Kong: a study on the mode of contamination. *Journal of hygiene*, 78(2), 253-260.
- Ejeta, G., Molla, B., Alemayehu, D., & Mackie, A. (2004). *Salmonella* serotypes isolated from milled meat beef, mutton and pock in Addis Ababa, Ethiopia. *Revue de Médecine vétérinaire*, 155(11), 547-551.
- Escartina, E.F., Lozano, J. S., & Garcia, O. R. (2000). Quantitative survival of native *Salmonella* serovars during storage of frozen raw pork. *International Journal of Food Microbiology*, 54, 19–25.
- European Commission. (2000). Opinion of the scientific committee on veterinary measures relating to public health on food-borne zoonoses In Directorate B-Scientific Health Opinions. Unit B3-Management of scientific committees II. (pp. 183) Brussele.
- FAO/WHO. (2002). Risk assessment in *Salmonella* in eggs and broilers chickens. 7-24.
- Forbes, B. A., Daniel, F. S., & Alice, S. W. (2002). *Diagnostic microbiology*. Mosby: St.Louis.
- Jay, J.M. (2000). *Modern food microbiology*. Gaithersburg: Aspen Publication.

- Kalimuddin-Choudhary, S.P. (1999). Sources of contamination of pork and pork products with *Salmonella* in a pork processing plant. *Indian Journal of Microbiology, Immunology and Infectious Diseases*, 20(1), 47-49.
- Koneman, E.W., Allen, S.D., Janda, W.M., Schreckenberger, P.C., & Winn, W.C. (1994). *Introduction to diagnostic microbiology*. Philadelphia: J.B.Lippincott Company.
- Motsoela, C., Collison, E. K., & Gashe, B. A. (2002). Prevalence of *Salmonella* in two Botswana Abattoir environments. *Journal of Food Protection*, 65, 1869-1872.
- Mrema, N., Mpuchane, S., & Gashe, B.A. (2006). Prevalence of *Salmonella* in meat, raw fresh sausages and raw burger patties from retail outlets in Garborone, Botswana. *Food Control*, 17, 207-212.
- Phan, T.T., Khai, L.T., Ogasawara, N., Tam, N.T., Okatani, A.T., Akiba, M., & Hayashidani, H. (2005). Contamination of *Salmonella* in retail meats and shrimps in the Mekong Delta, Vietnam. *Journal of Food Protection*, 68(5), 1077-1080.
- Swanenburg, M., Van Der Wolf, P.J., Urlings, H.A.P., Snijders, J.M.A., & Van Knapen, F. (2001). *Salmonella* in slaughter pigs: the effect of logistic slaughter procedures of pigs on the prevalence of *Salmonella* in pork. *International Journal of Food Microbiology*, 70, 231-242.
- Tegegne, M., & Ashenafi, M. (1998). Microbial load and incidence of *Salmonella* species in 'kitfo', traditional Ethiopian spiced, minced meat dish. *Ethiopian Journal Health Development (Addis Ababa)*, 12, 135-140.