

สถิติทดสอบเพื่อคัดเลือกตัวแบบการทดด้วยเชิงเส้นพหุคุณ

Test Statistics for Selecting Multiple Linear Regression Models

พลากร สีน้อย* และ จิราวัลย์ จิตรตเวช

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Palakorn Seenoi* and Jirawan Jitthavech

School of Applied Statistics, National Institute of Development Administration

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้เสนอสถิติทดสอบเพื่อการคัดเลือกตัวแบบการทดด้วยเชิงเส้นพหุคุณ โดยสร้างสถิติทดสอบจากเกณฑ์ซีพี และเกณฑ์เอไอซี สถิติทดสอบที่สร้างขึ้นนี้เรียกว่าสถิติทดสอบซีพี และสถิติทดสอบเอไอซี ตามลำดับ การคัดเลือกตัวแบบใช้วิธีการกำจัดตัวแปรแบบถอยหลัง โดยใช้เกณฑ์ซีพี เกณฑ์เอไอซี สถิติทดสอบซีพี สถิติทดสอบเอไอซี และสถิติทดสอบเอฟบางส่วน การศึกษาได้ใช้วิธีการเปรียบเทียบเกณฑ์และสถิติทดสอบทั้ง 5 โดยวิธีการจำลองข้อมูล และพิจารณา率อยละของจำนวนครั้งที่คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องขนาดตัวอย่างเท่ากับ 10, 15 และ 20 สถิติทดสอบเอฟบางส่วน คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องมากกว่าเกณฑ์และสถิติทดสอบอื่น เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 25 และ 30 สถิติทดสอบซีพี สถิติทดสอบเอไอซี และสถิติทดสอบเอฟบางส่วน คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องใกล้เคียงกันและคัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องมากกว่าเกณฑ์อื่น และเมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 50, 100 และ 150 สถิติทดสอบซีพี และสถิติทดสอบเอไอซี คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องใกล้เคียงกันและคัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องมากกว่าเกณฑ์และสถิติทดสอบอื่น และสถิติทดสอบซีพี ได้ตัวแบบ Over-fit น้อยกว่าสถิติทดสอบเอไอซี

คำสำคัญ : การคัดเลือกตัวแบบ การกำจัดตัวแปรแบบถอยหลัง เกณฑ์ซีพี เกณฑ์เอไอซี สถิติทดสอบเอฟบางส่วน

Abstract

This research has proposed test statistics for model selection in multiple linear regressions. The test statistics created by C_p and AIC criteria are called C_p -test and AIC-test statistics respectively. Model selection is conducted by backward elimination method using C_p , AIC criteria and C_p -test, AIC-test and Partial F-test statistics. Verification of making correct model selection under the five criteria based on the percent correctness is achieved through simulation technique. The results indicate that the Partial F-test statistic gives greater correct model selection than other criteria and test statistics when sample sizes equal to 10, 15 and 20. In sample sizes equal to 25 and 30, three of the C_p -test, the AIC-test and the Partial F-test statistics give similar correct percentage which is greater than other criteria. For sample sizes equal to 50, 100 and 150, the C_p -test and the AIC-test statistics give similar correct percentage which is greater than other criteria and test statistics, and the C_p -test is less likely to yield an over-fit model than the AIC-test.

Keywords : Model Selection, Backward Elimination, C_p , AIC, Partial F-test

Corresponding author. Email: seenoi_p@hotmail.com

บทนำ

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคุณ (Multiple Linear Regression Analysis) เป็นการหารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Dependent Variable) กับตัวแปรอิสระ (Independent Variables) เพื่อนำไปพยากรณ์ตัวแปรตาม เมื่อจำนวนตัวแปรอิสระมีตั้งแต่สองตัวขึ้นไป ตัวแบบที่เหมาะสมในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคุณควรมีจำนวนตัวแปรอิสระน้อยที่สุด แต่ทำให้ได้สมการถดถอยที่สามารถพยากรณ์ได้ถูกต้องและแม่นยำที่สุด เพราะหากมีจำนวนตัวแปรอิสระมากเกินไป ความคลาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์มีค่าสูงขึ้น นอกจากนี้ตัวแปรอิสระบางตัวอาจมีความสัมพันธ์กันเอง เกิดปัญหาพหุสัมพันธ์ (Multicollinearity) ส่งผลให้ความแปรปรวนของค่าประมาณพารามิเตอร์ของตัวแบบมีค่าสูง ทำให้การทดสอบพารามิเตอร์ในตัวแบบไม่มีนัยสำคัญ ดังนั้นการคัดเลือกตัวแปรอิสระหรือการคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสม ใน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคุณจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

เกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบที่นิยมใช้เป็นอันดับแรก และพบในหนังสือการถดถอยในทุกวันนี้ คือ สัมประสิทธิ์ตัวกำหนดปรับปรุง (Adjusted Coefficient of Determination) (McQuarrie & Tsai, 1998) หรือ R^2_{adj} นักวิจัยเข้าใจว่าตัวแบบใดให้ R^2_{adj} ค่าสูงที่สุด แสดงว่าตัวแบบนั้นเหมาะสมที่สุด แต่ความเป็นจริงตัวแบบที่ให้ค่า R^2_{adj} สูงที่สุด จะทำให้ตัวแบบที่ได้รับการคัดเลือก มีจำนวนตัวแปรอิสระในตัวแบบมากเกินไป (Over-fit) (Sheather, 2009)

ตัวยเหตุนี้จึงมีนักสถิติหลายท่านได้สร้างเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบ เช่น มอลโลว์ (Mallows, 1973) ได้เสนอเกณฑ์ซีพี (C_p) แต่เมื่อตัวอย่างมีขนาดเล็กจะทำให้ตัวแบบที่ได้รับการคัดเลือกมีจำนวนตัวแปรอิสระในตัวแบบมากเกินไป (Over-fit) ด้วยเหตุนี้ รา และ วู (Rao & Wu, 2005 อ้างถึงใน รุจนา คุณเจริญกิติ, 2549) ได้เสนอเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบอีกน้ำหนึ่ง โดยลดโอกาสที่จะทำให้ตัวแบบที่ได้รับการคัดเลือกมีจำนวนตัวแปรอิสระมากกว่าหรือน้อยกว่าความเป็นจริง จึงทำให้เกณฑ์ที่เสนอขึ้นใหม่นี้คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องมากขึ้นเมื่อตัวอย่างขนาดเล็ก

อาไคเค (Akaike, 1973) ได้เสนอเกณฑ์ข้อมูลเทคโนโลยี (Akaike's Information Criterion: AIC) หรือเกณฑ์เอไอซี โดยตัวแบบที่ให้ค่า AIC น้อยที่สุด แสดงว่าตัวแบบนั้นเหมาะสมที่สุด ซึ่งเกณฑ์นี้ใช้ได้มีตัวอย่างมีขนาดใหญ่ แต่เมื่อตัวอย่างมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับจำนวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณ จะทำให้ตัวแบบที่ได้รับการคัดเลือกมีจำนวนตัวแปรอิสระ

ในตัวแบบมากเกินไป (Over-fit) ด้วยเหตุนี้ เออร์วิช และไซ (Hurvich & Tsai, 1989) ได้เสนอเกณฑ์เอไอซีซี (AIC_c) เพื่อลดการเกิดปัญหาดังกล่าว แต่เมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้นเกณฑ์เอไอซีซี จะทำให้ตัวแบบที่ได้รับการคัดเลือก มีจำนวนตัวแปรอิสระในตัวแบบมากเกินไป (Over-fit) ดังนั้น แม้ค่าวารีและคณ (McQuarrie et al., 1997) ได้เสนอเกณฑ์เอไอซียู (AIC_u) ซึ่งเมื่อตัวอย่างมีขนาดใหญ่จะคัดเลือกตัวแบบได้ดีกว่าเกณฑ์เอไอซีซี

จากเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบที่นักสถิติได้เสนอในข้างต้น จะทำการคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากตัวแบบที่ให้ค่าของเกณฑ์นั้นๆ ต่ำที่สุด เช่น หากพิจารณาจากเกณฑ์ซีพี ก็จะคำนวณค่า C_p ทุกตัวแบบที่เป็นไปได้ ตัวแบบใดให้ค่า C_p ต่ำสุด ถือว่าตัวแบบนั้นเหมาะสมที่สุด แต่เนื่องจากต้องพิจารณาทุกตัวแบบที่เป็นไปได้ เมื่อตัวแปรอิสระมีจำนวนมาก การใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันในการพิจารณาอาจได้ตัวแบบที่แตกต่างกันได้ นอกเหนือผู้วิจัยจะต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาว่าควรเลือกตัวแบบใด เพราะตัวแบบที่พิจารณาอาจจะให้ค่าของเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแบบใกล้เคียงกัน แต่ค่าของเกณฑ์ที่ลดลงอาจจะไม่มีนัยสำคัญ จึงควรหยุดกระบวนการในการคัดเลือกผู้วิจัยจะเสนอวิธีการสร้างสถิติทดสอบสำหรับการคัดเลือกตัวแบบในการวิเคราะห์การถดถอย โดยพิจารณาจากการแจกแจงของเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบ

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอสถิติทดสอบ สำหรับการคัดเลือกตัวแบบในการวิเคราะห์การถดถอย โดยได้เสนอสถิติทดสอบสำหรับการคัดเลือกตัวแบบ คือ สถิติทดสอบซีพี (C_p -test) และสถิติทดสอบเอไอซี (AIC -test) และได้ทำการเปรียบเทียบการทดสอบกับสถิติทดสอบเอกฟางล่วน (Partial F-test) และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบที่ใช้เกณฑ์ซีพี (C_p) และเกณฑ์เอไอซี (AIC) คัดเลือกตัวแบบด้วยเกณฑ์ต่ำสุด

ทฤษฎีที่ใช้

ตัวแบบการถดถอยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ มีดังนี้

ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคุณที่แท้จริง (True Multiple Linear Regression Model)

$$y = X^* \beta^* + \varepsilon^*$$

เมื่อ $y = (y_1, \dots, y_n)'$ เป็นเวกเตอร์สุ่มของค่าลังกอกของตัวแปรตาม n เป็นขนาดตัวอย่าง $y = (y_1, \dots, y_n)'$ เป็นเมตริกซ์ของตัวแปรอิสระ ที่มีขนาด $n \times p^*$ k^* เป็นจำนวนตัวแปรอิสระ

$p^* = k^* + 1$ เป็นจำนวนพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่า $\beta^* = (\beta_0^*, \beta_1^*, \dots, \beta_{k^*}^*)'$ เป็นเวกเตอร์สัมประสิทธิ์การถดถอยที่ไม่ทราบค่า $\varepsilon^* = (\varepsilon_1^*, \dots, \varepsilon_n^*)'$ เป็นเวกเตอร์ของความคลาดเคลื่อนสุ่ม ที่มีการแจกแจง $N_n(\mathbf{0}, \sigma^{*2} I_n)$

ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคุณที่เหมาะสม (Fitted or Candidate Multiple Linear Regression Model)

$$\mathbf{y} = X\beta + \varepsilon$$

เมื่อ $X = (\mathbf{1}, \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k)$ เป็นเมตริกซ์ของตัวแปรอิสระที่มีขนาด $n \times p$ k เป็นจำนวนตัวแปรอิสระ $p = k + 1$ เป็นจำนวนพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่า $\beta = (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k)'$ เป็นเวกเตอร์สัมประสิทธิ์การถดถอยที่ไม่ทราบค่า $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)'$ เป็นเวกเตอร์ของความคลาดเคลื่อนสุ่ม ที่มีการแจกแจง $N_n(\mathbf{0}, \sigma^{*2} I_n)$

ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคุณเต็มรูป (Full Multiple Linear Regression Model)

$$\mathbf{y} = X_{full}\beta_{full} + \varepsilon$$

เมื่อ $X_{full} = (\mathbf{1}, \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{k_{full}})$ เป็นเมตริกซ์ของตัวแปรอิสระที่มีขนาด $n \times p_{full}$ k_{full} เป็นจำนวนตัวแปรอิสระทั้งหมด $p_{full} = k_{full} + 1$ เป็นจำนวนพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่า $\beta_{full} = (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_{k_{full}})'$ เป็นเวกเตอร์สัมประสิทธิ์การถดถอยที่ไม่ทราบค่า

เนื่องจากตัวแบบที่ศึกษาเป็นตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคุณ ที่ค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติ ทำให้การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square Method) ได้ตัวประมาณค่า คือ

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y$$

$$MSE = \frac{SSE}{n-p}$$

เมื่อ $SSE = (\mathbf{y} - X\hat{\beta})'(\mathbf{y} - X\hat{\beta})$ เป็นผลบวกกำลังสองของค่าคลาดเคลื่อน

เกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคุณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้

1. เกณฑ์ชีพ (C_p)

มอลโลว์ (Mallows, 1973) ได้เสนอเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบที่เกี่ยวข้องกับค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Mean Square Error) ของค่าประมาณ $\hat{\mathbf{y}}$ โดยนิยามให้

$$\Gamma_p = \frac{1}{\sigma^2} E \left[(\hat{\mathbf{y}} - E(\mathbf{y}))' (\hat{\mathbf{y}} - E(\mathbf{y})) \right]$$

เป็นค่าคาดหมายของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองของค่าพยากรณ์ กับค่าคาดหมายของ y หารด้วย σ^2 จึงได้

$$\begin{aligned} \Gamma_p &= \frac{1}{\sigma^2} \left\{ E \left[(\hat{\mathbf{y}} - E(\hat{\mathbf{y}}))' (\hat{\mathbf{y}} - E(\hat{\mathbf{y}})) \right] + \right. \\ &\quad \left. \left[(E(\mathbf{y}) - E(\hat{\mathbf{y}}))' (E(\mathbf{y}) - E(\hat{\mathbf{y}})) \right] \right\} \\ &= \frac{1}{\sigma^2} \left\{ p\sigma^2 + \left[(E(\mathbf{y}))' (I - H)(E(\mathbf{y})) \right] \right\}; \\ H &= X(X'X)^{-1}X' \\ &= \frac{1}{\sigma^2} \left\{ p\sigma^2 - tr[(I - H)\sigma^2] + E[y'(I - H)y] \right\} \\ &= \frac{1}{\sigma^2} \left\{ p\sigma^2 + [E(SSE) - (n - p)\sigma^2] \right\} \\ &= \frac{E(SSE)}{\sigma^2} - (n - 2p) \end{aligned} \quad \dots\dots (1)$$

เมื่อ $E(\mathbf{y})$ เป็นค่าคาดหมายของตัวแปรตามจากตัวแบบการถดถอยที่แท้จริง

$E(\hat{\mathbf{y}})$ เป็นค่าคาดหมายของค่าพยากรณ์จากตัวแบบที่มีพารามิเตอร์ p ตัว

$$E \left[(\hat{\mathbf{y}} - E(\hat{\mathbf{y}}))' (\hat{\mathbf{y}} - E(\hat{\mathbf{y}})) \right]$$

$$\left[(E(\mathbf{y}) - E(\hat{\mathbf{y}}))' (E(\mathbf{y}) - E(\hat{\mathbf{y}})) \right]$$

เป็นความแปรปรวนของ $\hat{\mathbf{y}}$
กำลังสอง (Square Bias)

ให้ C_p เป็นตัวประมาณของ Γ_p ดังนั้น

$$C_p = \frac{SSE}{MSE_{full}} - n + 2p \quad \dots\dots (2)$$

ตัวแบบการถดถอยที่เหมาะสมเป็นตัวแบบที่มีค่า C_p ตัว และมีค่าใกล้กับ p ถ้า C_p มีค่าเท่ากับ p ตัวประมาณ C_p จะไม่มีความเอนเอียง ถ้า C_p มีค่ามากกว่า p ตัวประมาณ C_p จะมีความเอนเอียงมาก แต่ถ้า C_p มีค่าน้อยกว่า p ตัวประมาณ C_p จะมีความเอนเอียงน้อย (ทรงคีรี, 2548)

2. เกณฑ์ข้อสนเทศโคไคเค (AIC)

โคไคเค (Akaike, 1973) ได้เสนอเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบคือเกณฑ์เอไอซี ซึ่งสร้างจากการประมาณความแปรปรวนของข้อสนเทศคูลล์เบลล์-ไลท์เบอร์ (Kullback Leibler Information) ระหว่างตัวแบบที่แท้จริง (True Model) กับตัวแบบที่เหมาะสมที่มีคุณสมบัติไม่เอนเอียง เมื่อขนาดตัวอย่างใหญ่ การคัดเลือกตัวแบบโดยใช้เกณฑ์เอไอซี เลือกตัวแบบที่ให้ค่าเอไอซีต่ำสุด เป็นตัวแบบที่ดีที่สุด และเกณฑ์เอไอซี คัดเลือกตัวแบบได้ดีเมื่อ

ตัวอย่างมีขนาดใหญ่ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการคัดเลือกตัวแบบสูงเมื่อตัวอย่างมีขนาดเล็ก (McQuarrie *et al.*, 1997) เกณฑ์เอไอซี นิยามโดย

$$\begin{aligned}
 AIC_p &= -2 \left[\log(L(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_k, \hat{\sigma}^2 | y)) + (p+1) \right] \\
 &= -2 \left[-\frac{n}{2} \log(2\pi) - \frac{n}{2} \log\left(\frac{SSE}{n}\right) - \frac{n}{2} + (p+1) \right] \\
 &= n \log(2\pi) + n \log\left(\frac{SSE}{n}\right) + n + 2(p+1) \\
 &= n \log\left(2\pi \frac{SSE}{n}\right) + n + 2(p+1) \\
 &= n \log(2\pi \hat{\sigma}^2) + n + 2(p+1)
 \end{aligned} \quad \dots \quad (3)$$

เมื่อ $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} y'(I_n - P_X)y$ เป็นตัวประมาณด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุดของ σ^2

$P_X = X(X'X)^{-1}X'$ เป็นเมตริกซ์ภาพฉาย

3. สถิติทดสอบซีพี (C_p -test)

พิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบ C_p จากสมการ (2)

$$\begin{aligned}
 \text{ให้ } Y &= C_p + n - 2p \text{ จะได้ } Y = \frac{SSE}{MSE_{full}} \text{ หรือ} \\
 Y &= \frac{SSE}{E(MSE)} \text{ มีการแจกแจงໄດ้กำลังสอง ที่มีองค์ความเรื่อง } n-p \text{ ดังนั้น } E(Y) = n-p \text{ และ } Var(Y) = 2(n-p)
 \end{aligned}$$

เมื่อขนาดตัวอย่างใหญ่พอ $\frac{Y - E(Y)}{\sqrt{Var(Y)}}$ ประมาณด้วย

การแจกแจงปกติมาตรฐานเชิงกำกับ (Asymptotic Standard Normal Distribution) (Canal, 2005)

สร้างสถิติทดสอบสมมติฐาน $H_0: \Gamma_p = \Gamma_{p_{full}}$ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 T_{C_p} &= \frac{(C_p + n - 2p) - (n - p_{full})}{\sqrt{2(n - p_{full})}} \\
 &= \frac{C_p - 2p + p_{full}}{\sqrt{2(n - p_{full})}} \rightarrow N(0,1)
 \end{aligned} \quad \dots \quad (4)$$

เมื่อ $\Gamma_{p_{full}}$ เป็นค่าคาดหมายของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองของค่าพยากรณ์กับค่าคาดหมายของ y หารด้วย σ^2 จากตัวแบบการทดสอบโดยเต็มรูป

จะปฏิเสธ H_0 เมื่อ $|T_{C_p}|$ มีค่ามากกว่า $z_{\alpha/2}$ ซึ่งหมายถึง

ไม่สามารถนำตัวแบบร่วมกันออกจากตัวแบบได้

4. สถิติทดสอบเอไอซี (AIC-test)

yanagihara และ ohmoto (Yanagihara & Ohmoto, 2005) ได้พิจารณาการแจกแจงเชิงกำกับ (Asymptotic Distribution) ของเกณฑ์เอไอซี และเสนอคุณลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของเกณฑ์เอไอซี ในตัวแบบการทดสอบเช่น เช่น ความเบี้ยว (Skewness) ความโด่ง (Kurtosis) ซึ่งจะบอกถึงความแม่นยำของการประมาณด้วยการแจกแจงปกติ เมื่อกำหนดให้จากสมการ (3)

ค่าคาดหมายของ AIC_p เท่ากับ

$$E(AIC_p) = n(\log(2\pi\sigma^2\delta^2) + 1) + 2(p+1) - p\delta^{-2} - \frac{1}{2}\tau^2\delta^{-4}$$

และความแปรปรวนของ AIC_p เท่ากับ

$$\psi_p^2 = n\tau^2\delta^{-4} + h^2\delta^{-8}$$

เมื่อ $\delta^2 = 1 + \theta^2$

$$\theta^2 = \frac{1}{\sigma^{*2}n} \boldsymbol{\beta}' X^{*'} (I_n - P_X) X^* \boldsymbol{\beta}^*$$

$$\tau^2 = 2(1 + 2\theta^2)$$

$$h^2 = 2(p+1) + 8(p+1)\theta^2 + 2(3p+8)\theta^4$$

yanagihara และ ohmoto พบว่าเอไอซี มีความเบี้ยวแต่ค่ามาตรฐานของเอไอซี ไม่มีความเบี้ยว และมีการแจกแจงปกติมาตรฐานเชิงกำกับ (Asymptotic Standard Normal Distribution) (Yanagihara & Ohmoto, 2005) นั่นคือ

$$\frac{AIC_p - E(AIC_p)}{\sqrt{\psi_p^2}} \rightarrow N(0,1)$$

สร้างสถิติทดสอบสมมติฐาน $H_0: E(AIC_p) = E(AIC_{full})$ ได้ดังนี้

$$T_{AIC} = \frac{AIC_p - E(AIC_{full})}{\sqrt{\psi_{full}^2}}$$

เมื่อประมาณ $E(AIC_{full})$ ด้วย $\widehat{E(AIC_{full})}$ และประมาณ ψ_{full}^2 ด้วย $\hat{\psi}_{full}^2$ จึงได้ค่าประมาณของสถิติ T_{AIC} คือ

$$t_{AIC} = \frac{AIC_p - \widehat{E(AIC_{full})}}{\sqrt{\hat{\psi}_{full}^2}} \rightarrow N(0,1) \quad \dots \quad (5)$$

เมื่อ $E(AIC_{full})$ เป็นค่าคาดหมายของข้อสนเทศภาคตะวันออกเฉียงใต้

$\widehat{E(AIC_{full})}$ เป็นค่าประมาณค่าคาดหมายของข้อสนเทศภาคตะวันออกเฉียงใต้

ψ_{full}^2 เป็นความแปรปรวนของข้อสนเทศօaic เดเคจากตัวแบบการทดสอบโดยเดิมรูป

และ $\hat{\psi}_{full}^2$ เป็นค่าประมาณความแปรปรวนของข้อสนเทศօaic เดเค จากตัวแบบการทดสอบโดยเดิมรูป

จะปฏิเสธ H_0 เมื่อ $|t_{AIC}|$ มีค่ามากกว่า $z_{\frac{\alpha}{2}}$ ซึ่งหมายถึง

ไม่สามารถนำตัวแปรอิสระออกจากตัวแบบได้

5. สติติดทดสอบเอฟบังส่วน (Partial F-test)

การคัดเลือกตัวแบบอาจใช้สติติดทดสอบเอฟบังส่วน เป็นการทดสอบล้มปะลีทีการทดสอบของตัวแปรอิสระที่เราสนใจว่ามีส่วนในการอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามหรือไม่ อาจทดสอบที่ละตัวหรือทดสอบหลายตัวพร้อมกันก็ได้

สมมติให้ตัวแบบเต็มรูป (Full Model) คือ $y = X_{full}\beta_{full} + \varepsilon = X_r\beta_r + X_q\beta_q + \varepsilon$ โดยที่ $q+r = p_{full}$ เมื่อ $X_{full} = (X_q, X_r)$ และ $\beta_{full} = (\beta_q, \beta_r)'$

หากต้องการทดสอบ $H_0: \beta_q = 0$ โดยที่ $\beta_q = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_q)'$ เมื่อ $q < p_{full}$

จะได้ตัวแบบลดรูป (Reduced Model) คือ $y = X_r\beta_r + \varepsilon$ เมื่อ $X_r = (\mathbf{1}, x_{q+1}, \dots, x_{q+r-1})$ และ $\beta_r = (\beta_0, \beta_{q+1}, \dots, \beta_{q+r-1})'$

จากนั้นจะใช้ผลบวกค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองของตัวแบบลดรูปและตัวแบบเต็มรูป ในการคำนวนสติติดทดสอบจะได้สติติดทดสอบเอฟบังส่วน คือ

$$F = \frac{(\hat{\beta}_r' X_r' y - \hat{\beta}'_{q+r} X_{q+r}' y) / q}{\hat{\beta}'_{q+r} X_{q+r}' y / (n-q-r)} \quad \dots \quad (6)$$

จะปฏิเสธ H_0 เมื่อ $F > F_{\alpha, q, (n-q-r)}$ ซึ่งหมายถึงตัวแปรอิสระ X_q มีส่วนในการอธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม

วิธีดำเนินการและขั้นตอนการคัดเลือกตัวแบบ

1. วิธีดำเนินการ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษากรณีที่ตัวแปรอิสระมีการแจกแจงเอกรูป และการแจกแจงปกติ ดังนี้

กรณีตัวแปรอิสระมีการแจกแจงเอกรูป

สร้างตัวแปรอิสระให้มีการแจกแจงเอกรูป (Uniform Distribution) ดังนี้ $x_1 \sim U(10, 150) \quad x_2 \sim U(0, 1000) \quad x_3 \sim U(8000, 15000) \quad x_4 \sim U(-200, 100) \quad x_5 \sim U(-300, -500) \quad x_6 \sim U(5, 15)$ และ $x_7 \sim U(500, 2000)$

สร้างค่าความคลาดเคลื่อนในตัวแบบการทดสอบโดยเชิงเส้นพหุคูณที่แท้จริงให้มีการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 50 หรือ $\varepsilon^* \sim N(0, 50^2)$ ให้มีขนาดเท่ากับขนาดประชากร โดยกำหนดให้ประชากรมีขนาด 100000

กำหนดค่าพารามิเตอร์ หรือค่าล้มปะลีทีการทดสอบอยู่ในตัวแบบการทดสอบโดยเชิงเส้นพหุคูณที่แท้จริง คือ $\beta^* = (-20, 60, 150, 35, -100)$

กรณีตัวแปรอิสระมีการแจกแจงปกติ

สร้างตัวแปรอิสระให้มีการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ดังนี้ $x_1 \sim N(45, 30^2) \quad x_2 \sim N(-60, 100^2) \quad x_3 \sim N(500, 80^2) \quad x_4 \sim N(1000, 150^2) \quad x_5 \sim N(10, 5^2) \quad x_6 \sim N(-200, 130^2)$ และ $x_7 \sim N(3500, 500^2)$

สร้างค่าความคลาดเคลื่อนในตัวแบบการทดสอบโดยเชิงเส้นพหุคูณที่แท้จริงให้มีการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 64 หรือ $\varepsilon^* \sim N(0, 64^2)$ ให้มีขนาดเท่ากับขนาดประชากร

กำหนดค่าพารามิเตอร์ หรือค่าล้มปะลีทีการทดสอบอยู่ในตัวแบบการทดสอบโดยเชิงเส้นพหุคูณที่แท้จริง คือ $\beta^* = (8, 20, -15, 70, 40)$

สร้างตัวแปรตาม y จากตัวแบบการทดสอบโดยเชิงเส้นพหุคูณที่แท้จริง $y = X^* \beta^* + \varepsilon^*$ เมื่อ $X^* = (\mathbf{1}, x_1, x_2, x_3, x_4)$ ให้มีขนาดเท่ากับขนาดประชากร

เมื่อได้ประชากรตามขนาดที่ต้องการแล้ว ให้สุ่มตัวอย่างขนาด 10 15 20 25 30 50 100 และ 150 ในการสุ่มตัวอย่างแต่ละขนาดให้สุ่มช้ำจำนวน 1000 ครั้ง โดยให้ถือว่าตัวอย่างที่สุ่มได้เป็นตัวอย่างที่สุ่มมาจากตัวแบบการทดสอบโดยเชิงเส้นพหุคูณที่แท้จริง จะได้ $y = X_{full}\beta_{full} + \varepsilon$ เมื่อ $X_{full} = (\mathbf{1}, x_1, x_2, \dots, x_7)$

ทำการคัดเลือกตัวแบบด้วยเกณฑ์ชีพี เกณฑ์เอไอซี สติติดทดสอบชีพี สติติดทดสอบเอไอซี และสติติดทดสอบเอฟบังส่วน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญในการทดสอบ 0.05 หากเกณฑ์หรือสติติดทดสอบได้ คัดเลือกตัวแบบได้ตัวแบบการทดสอบโดยเชิงเส้นพหุคูณที่แท้จริง หรือได้ตัวแปรอิสระในตัวแบบเฉพาะ $X^* = (\mathbf{1}, x_1, x_2, x_3, x_4)$ เท่านั้น แสดงว่าคัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้อง หากเกณฑ์หรือสติติดทดสอบได้คัดเลือกตัวแบบแล้วมีจำนวนตัวแปรอิสระมากกว่าจำนวนตัวแปรอิสระในตัวแบบการทดสอบโดยเชิงเส้นพหุคูณที่แท้จริง แสดงว่าตัวแบบที่ได้ Over-fit และหากเกณฑ์หรือสติติดทดสอบได้คัดเลือกตัวแบบแล้วได้จำนวนตัวแปรอิสระน้อยกว่าจำนวนตัวแปรอิสระในตัวแบบการทดสอบ

เชิงเล้นพหุคุณที่แท้จริง แสดงว่าตัวแบบที่ได้ Under-fit ทำการทดลองซ้ำ 1000 ครั้ง ในแต่ละขนาดตัวอย่าง พิจารณาอยู่ละที่แต่ละเกณฑ์และสถิติทดสอบ สามารถคัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้อง

2. ขั้นตอนการคัดเลือกตัวแบบ

งานวิจัยนี้ได้ทำการคัดเลือกตัวแบบด้วยการกำจัดตัวแบบโดยหลัง (Backward Elimination) โดยทั่วไปการกำจัดตัวแปรอิสระแบบโดยหลังจะเป็นวิธีการคัดเลือกตัวแบบการลดโดยที่ดีที่สุด (ทรงศิริ แต้สมบัติ, 2548; Montgomery *et al.*, 2006) ทำได้โดยกำหนดให้สามารถลดโดยประกอบด้วยตัวแปรอิสระทั้งหมดก่อน แล้วคัดเลือกตัวแปรอิสระ ที่ไม่มีส่วนในการอธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม ออกจากตัวแบบทีละตัว โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกตัวแบบของแต่ละเกณฑ์ ดังนี้

ขั้นตอนการคัดเลือกตัวแบบสำหรับเกณฑ์ชีพี และเกณฑ์เอไอซี

ขั้นที่ 1 คำนวนค่า C_p และ AIC_p จากตัวแบบที่มีตัวแปรอิสระทุกตัว สมมติให้เป็น $C_{P_{full}}$ และ $AIC_{P_{full}}$ ตามลำดับ

ขั้นที่ 2 คำนวนค่า C_p และ AIC_p ของทุกตัวแบบที่เป็นไปได้ เมื่อนำตัวแปรอิสระออกจากตัวแบบ 1 ตัว

ขั้นที่ 3 พิจารณาตัวแบบที่มีค่า C_p และ AIC_p น้อยกว่าตัวแบบอื่นๆ สมมติให้เป็น $C_{P_{min}}$ และ AIC_{min} ตามลำดับ

ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบค่า C_p และ AIC_p ถ้า $C_{P_{min}}$ และ AIC_{min} มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ $C_{P_{full}}$ และ AIC_{full} ตามลำดับ แสดงว่าสามารถนำตัวแปรอิสระที่ทำให้ $C_{P_{min}}$ และ AIC_{min} ออกจากตัวแบบได้และจะไม่นำตัวแปรอิสระนี้มาพิจารณาอีก แต่ถ้า $C_{P_{min}}$ และ AIC_{min} มีค่ามากกว่า $C_{P_{full}}$ และ AIC_{full} ตามลำดับ แสดงว่าไม่สามารถนำตัวแปรอิสระออกจากตัวแบบได้ และลื้นสุดการคัดเลือกตัวแบบ

ขั้นที่ 5 ให้ทำซ้ำในขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ส่วนในขั้นที่ 4 ให้เปรียบเทียบค่า $C_{P_{min}}$ และ AIC_{min} ในรอบปัจจุบัน กับค่า $C_{P_{min}}$ และ AIC_{min} ในรอบก่อนหน้า ถ้า $C_{P_{min}}$ และ AIC_{min} ในรอบปัจจุบันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ $C_{P_{min}}$ และ AIC_{min} ในรอบก่อนหน้า แสดงว่าสามารถนำตัวแปรอิสระตัวที่ทำให้ $C_{P_{min}}$ และ AIC_{min} ออกจากตัวแบบได้ และทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถนำตัวแปรอิสระออกจากตัวแบบได้ และลื้นสุดการคัดเลือกตัวแบบ

ขั้นตอนการคัดเลือกตัวแบบสำหรับสถิติทดสอบชีพี และสถิติทดสอบเอไอซี

ขั้นที่ 1 คำนวนค่า C_p และ AIC_p ของทุกตัวแบบที่เป็นไปได้ เมื่อนำตัวแปรอิสระออกจากตัวแบบ 1 ตัว

ขั้นที่ 2 พิจารณาตัวแบบที่มีค่า C_p และ AIC_p น้อยกว่าตัวแบบอื่นๆ สมมติให้เป็น $C_{P_{min}}$ และ AIC_{min} ตามลำดับ

ขั้นที่ 3 คำนวนสถิติทดสอบ $T_{C_{P_{min}}}$ และ $T_{AIC_{min}}$ ถ้า $|T_{C_{P_{min}}}|$ และ $|t_{AIC_{min}}|$ มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ $\frac{\alpha}{2}$ แสดงว่าสามารถนำตัวแปรอิสระออกจากตัวแบบได้ และจะไม่นำตัวแปรอิสระนี้มาพิจารณาอีก แต่ถ้า $|T_{C_{P_{min}}}|$ และ $|t_{AIC_{min}}|$ มีค่ามากกว่า $\frac{\alpha}{2}$ แสดงว่าไม่สามารถนำตัวแปรอิสระออกจากตัวแบบได้ และลื้นสุดการคัดเลือกตัวแบบ

ขั้นที่ 4 ให้ทำซ้ำในขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 จนกระทั่งไม่สามารถนำตัวแปรอิสระออกจากตัวแบบได้ และจบการคัดเลือกตัวแบบ

ขั้นตอนการคัดเลือกตัวแบบสำหรับสถิติทดสอบเอฟนางส่วน

ขั้นที่ 1 ให้ตัวแบบเต็มรูปประกอบด้วยตัวแปรอิสระทั้งหมด

ขั้นที่ 2 คำนวนค่าสถิติเอฟบางส่วนของทุกตัวแบบที่เป็นไปได้ เมื่อนำตัวแปรอิสระออกจากตัวแบบ 1 ตัว

ขั้นที่ 3 พิจารณาตัวแบบที่มีค่าสถิติเอฟบางส่วนน้อยกว่าตัวแบบอื่นๆ สมมติให้เป็น F_{min}

ขั้นที่ 4 ทดสอบนัยสำคัญของ F_{min} ถ้า F_{min} มีนัยสำคัญ แสดงว่าไม่สามารถนำตัวแปรอิสระออกจากตัวแบบได้ แต่ถ้าพบว่า F_{min} ไม่มีนัยสำคัญก็จะนำตัวแปรอิสระนี้ออกจากตัวแบบ แล้วคำนวนค่าสถิติเอฟบางส่วนของทุกตัวแบบที่เป็นไปได้ จากตัวแปรอิสระที่เหลือใหม่อีกครั้ง และทำซ้ำขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 จนกระทั่งไม่สามารถนำตัวแปรอิสระออกจากตัวแบบได้ และจบการคัดเลือกตัวแบบ

ผลการศึกษา

ผลการคัดเลือกตัวแบบด้วยเกณฑ์ชีพี เกณฑ์เอไอซี สถิติทดสอบชีพี สถิติทดสอบเอไอซี และสถิติทดสอบเอฟบางส่วน เมื่อจำแนกตามการแยกแข่งของตัวแปรอิสระ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ได้ผลดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

จากตารางที่ 1 พบว่า เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 10 15 และ 20 สถิติทดสอบเอฟบางส่วน คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องมากกว่าเกณฑ์และสถิติทดสอบอื่น คิดเป็นร้อยละ 94.3 95.4 และ 95.1 ตามลำดับ

เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 25 และ 30 สถิติทดสอบชีพี และสถิติทดสอบเอไอซี และสถิติทดสอบเอฟบางส่วน คัดเลือก

ตารางที่ 1 ร้อยละของตัวแบบที่คัดเลือกได้ตามเกณฑ์และสถิติทดสอบ จำแนกตามผลการคัดเลือก และขนาดตัวอย่าง เมื่อตัวแปรอิสระมีการแจกแจงเอกรูป

ขนาดตัวอย่าง	ผลการคัดเลือก	เกณฑ์และสถิติทดสอบ				
		CP	AIC	CP-test	AIC-test	Partial F-test
10	Over-fit	53.4	86.9	49.9	63.4	5.7
	Fit	46.6	13.1	50.1	36.6	94.3
	Under-fit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	Over-fit	45.7	68.6	19.9	25.2	4.6
	Fit	54.3	31.4	80.1	74.8	95.4
	Under-fit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	Over-fit	43.1	60.9	9.9	12.6	4.9
	Fit	56.9	39.1	90.1	87.4	95.1
	Under-fit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	Over-fit	43.5	54.4	3.8	4.6	3.8
	Fit	56.5	45.6	96.2	95.4	96.2
	Under-fit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	Over-fit	44.0	54.6	3.2	3.8	5.5
	Fit	56.0	45.4	96.8	96.2	94.5
	Under-fit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	Over-fit	43.2	49.1	0.3	0.6	5.8
	Fit	56.8	50.9	99.7	99.4	94.2
	Under-fit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	Over-fit	39.8	43.0	0.0	0.0	3.9
	Fit	60.2	57.0	100.0	100.0	96.1
	Under-fit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150	Over-fit	39.5	41.3	0.0	0.0	4.9
	Fit	60.5	58.7	100.0	100.0	95.1
	Under-fit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

หมายเหตุ Over-fit คือร้อยละของตัวแบบที่ตัวแปรอิสระมีมากกว่าความเป็นจริง

Fit คือร้อยละของตัวแบบที่คัดเลือกได้ถูกต้อง

Under-fit คือร้อยละของตัวแบบที่ตัวแปรอิสระมีน้อยกว่าความเป็นจริง

ตัวแบบได้ถูกต้องไกล้เดียงกันและคัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องมากกว่าเกณฑ์อื่น ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 25 คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องร้อยละ 96.2 95.4 และ 96.2 ตามลำดับ ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 30 คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องร้อยละ 96.8 96.2 และ 95.4 ตามลำดับ

เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 50 100 และ 150 สถิติทดสอบบีพี และสถิติทดสอบเอไอซี คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องไกล้เดียงกัน


และคัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องมากกว่าเกณฑ์และสถิติทดสอบอื่น ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 50 คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องร้อยละ 99.7 และ 99.4 ตามลำดับ ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 100 และ 150 สถิติทดสอบทั้งสองคัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องร้อยละ 100.0

ทุกขนาดตัวอย่าง เกณฑ์เอไอซี มีร้อยละที่ตัวแปรอิสระ

ในตัวแบบมีมากกว่าความเป็นจริง มากกว่าเกณฑ์และสถิติทดสอบอื่น

ทุกขนาดตัวอย่าง ไม่มีเกณฑ์และสถิติทดสอบใด ที่ทำให้ร้อยละของตัวแบบที่ตัวแปรอิสระมีน้อยกว่าความเป็นจริง กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการคัดเลือกตัวแบบ

ด้วยเกณฑ์และสถิติทดสอบต่างๆ กับขนาดตัวอย่าง เมื่อตัวแปรอิสระมีการแจกแจงเอกรูป ได้แสดงร้อยละของตัวแบบที่คัดเลือกได้ถูกต้อง ในภาพที่ 1



ภาพที่ 1 ร้อยละของตัวแบบที่คัดเลือกได้ถูกต้อง เมื่อตัวแปรอิสระมีการแจกแจงเอกรูป

จากภาพที่ 1 พบว่า เมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น ร้อยละของตัวแบบที่คัดเลือกได้ถูกต้อง ด้วยเกณฑ์และสถิติทดสอบต่างๆ จะเพิ่มขึ้น ยกเว้นสถิติทดสอบเอฟบางส่วน เมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น ร้อยละของตัวแบบที่คัดเลือกได้ถูกต้องจะคงที่ ซึ่งคัดเลือกตัวแบบถูกต้องประมาณร้อยละ 95 เมื่อขนาดตัวอย่างใหญ่เกณฑ์ชีพและเกณฑ์เอไอซี มีแนวโน้มคัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องใกล้เคียงกัน สถิติทดสอบชีพและสถิติทดสอบเอไอซี คัดเลือกตัวแบบได้ดีเมื่อขนาดตัวอย่างใหญ่พอ เนื่องจากสถิติทดสอบทั้งสองเป็นสถิติทดสอบเชิงกำบัง ซึ่งต่างจากสถิติทดสอบเอฟบางส่วนที่คัดเลือกตัวแบบได้ดีทุกขนาดตัวอย่าง

จากตารางที่ 2 พบว่า เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 10 15 และ 20 สถิติทดสอบเอฟบางส่วน คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องมากกว่าเกณฑ์และสถิติทดสอบอื่น คิดเป็นร้อยละ 92.5 95.3 และ 93.2 ตามลำดับ

เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 25 และ 30 สถิติทดสอบชีพ สถิติทดสอบเอไอซี และสถิติทดสอบเอฟบางส่วน คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องใกล้เคียงกันและคัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องมากกว่าเกณฑ์อื่น ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 25 คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องร้อยละ

95.1 94.2 และ 95.1 ตามลำดับ ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 30 คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องร้อยละ 96.8 95.8 และ 94.7 ตามลำดับ

เมื่อขนาดตัวอย่างเท่ากับ 50 100 และ 150 สถิติทดสอบชีพ และสถิติทดสอบเอไอซี คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องใกล้เคียงกัน และคัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องมากกว่าเกณฑ์และสถิติทดสอบอื่น ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 50 คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องร้อยละ 99.1 และ 99.0 ตามลำดับ ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 100 สถิติทดสอบทั้งสองคัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องร้อยละ 99.9 ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 150 สถิติทดสอบทั้งสองคัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องร้อยละ 100.0

ทุกขนาดตัวอย่าง เกณฑ์เอไอซี มีร้อยละที่ตัวแปรอิสระในตัวแบบมีมากกว่าความเป็นจริง มากกว่าเกณฑ์และสถิติทดสอบอื่น

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการคัดเลือกตัวแบบด้วยเกณฑ์และสถิติทดสอบต่างๆ กับขนาดตัวอย่าง เมื่อตัวแปรอิสระมีการแจกแจงปกติ ได้แสดงร้อยละของตัวแบบที่คัดเลือกได้ถูกต้อง ในภาพที่ 2

ตารางที่ 2 ร้อยละของตัวแบบที่คัดเลือกได้ตามเกณฑ์และสถิติทดสอบ จำแนกตามผลการคัดเลือก และขนาดตัวอย่าง เมื่อตัวแปรอิสระมีการแจกแจงปกติ

ขนาดตัวอย่าง	ผลการคัดเลือก	เกณฑ์และสถิติทดสอบ				
		CP	AIC	CP-test	AIC-test	Partial F-test
10	Over-fit	51.2	86.2	47.6	59.7	3.8
	Fit	48.6	13.7	52.2	40.2	92.5
	Under-fit	0.2	0.1	0.2	0.1	3.7
15	Over-fit	45.7	66.6	21.0	25.9	4.7
	Fit	54.3	33.4	79.0	74.1	95.3
	Under-fit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	Over-fit	45.5	61.8	11.5	13.6	6.8
	Fit	54.5	38.2	88.5	86.4	93.2
	Under-fit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	Over-fit	41.7	52.2	4.9	5.8	4.9
	Fit	58.3	47.8	95.1	94.2	95.1
	Under-fit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	Over-fit	41.6	51.6	3.2	4.2	5.3
	Fit	58.4	48.4	96.8	95.8	94.7
	Under-fit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	Over-fit	40.7	45.8	0.9	1.0	6.0
	Fit	59.3	54.2	99.1	99.0	94.0
	Under-fit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	Over-fit	41.5	45.3	0.1	0.1	5.7
	Fit	58.5	54.7	99.9	99.9	94.3
	Under-fit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150	Over-fit	42.1	44.4	0.0	0.0	4.1
	Fit	57.9	55.6	100.0	100.0	95.9
	Under-fit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

จากการที่ 2 พบว่า ร้อยละของตัวแบบที่คัดเลือกได้ถูกต้อง เมื่อตัวแปรอิสระมีการแจกแจงปกติ คล้ายกับกรณีที่ตัวแปรอิสระมีการแจกแจงเอกรูป

สรุปผลและวิจารณ์ผล

จากการจำลองข้อมูลเมื่อตัวแปรอิสระมีการแจกแจงเอกรูปและมีการแจกแจงปกติ ได้ผลการคัดเลือกตัวแบบ สอดคล้องกัน ดังนี้


เมื่อขนาดตัวอย่างเล็ก (ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 10 15 และ 20) สถิติทดสอบเอนทางล่างล้วนคัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องมากกว่า

เกณฑ์และสถิติทดสอบอื่น

เมื่อขนาดตัวอย่างปานกลาง (ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 25 และ 30) สถิติทดสอบชีพี สถิติทดสอบเอไอซี และสถิติทดสอบเอนทางล่าง คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องใกล้เคียงกันและคัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องมากกว่าเกณฑ์อื่น

เมื่อขนาดตัวอย่างใหญ่ (ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 50 100 และ 150) สถิติทดสอบชีพีและสถิติทดสอบเอไอซี คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องใกล้เคียงกันและคัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องมากกว่าเกณฑ์และสถิติทดสอบอื่น

เมื่อขนาดตัวอย่างเล็ก เกณฑ์เอไอซี มีร้อยละของตัวแบบ



ภาพที่ 2 ร้อยละของตัวแบบที่คัดเลือกได้ถูกต้อง เมื่อตัวแปรอิสระมีการแจกแจงปกติ

ที่ตัวแปรอิสระมากกว่าความเป็นจริง มากกว่าจำนวนร้อยละของตัวแบบที่คัดเลือกได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของเกณฑ์เอไอซี ที่คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องเมื่อตัวอย่างมีขนาดใหญ่เท่านั้น

เมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น เกณฑ์และสถิติทดสอบต่างๆ มีร้อยละของตัวแบบที่คัดเลือกได้ถูกต้องเพิ่มขึ้น ยกเว้นสถิติทดสอบเบฟบานงส่วน ที่ร้อยละของตัวแบบที่คัดเลือกได้ถูกต้องคงที่ ซึ่งคัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องประมาณร้อยละ 95 ทุกขนาดตัวอย่าง

สถิติทดสอบชีพีและสถิติทดสอบเอไอซี คัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องเมื่อตัวอย่างใหญ่พอ เนื่องจากสถิติทดสอบทั้งสองเป็นสถิติทดสอบเชิงกำกับ

เอกสารอ้างอิง

- ทรงศิริ แต้สมบัติ. (2548). การวิเคราะห์การทดสอบ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- รจนา คุณเจริญจิต. (2549). การเปลี่ยนเทียบเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบในการวิเคราะห์การทดสอบเชิงเส้นพหุคูณ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- Akaike, H. (1973). Information Theory and an Extension of the Maximum Likelihood Principle. In 2nd International Symposium on Information Theory. B.N. Petrov and F. Csaki, eds. Akademiai Kiado, Budapest, 267-281.
- Canal, L. (2005). A Normal Approximation for the Chi-square Distribution. *Computational Statistics & Data Analysis*, 48, 803-808.
- Hurvich, C.M., & Tsai, C.L. (1989). Regression and Time Series Model Selection in Small Sample. *Biometrika Trust*, 76(2), 297-307.
- Mallows, C.L. (1973). Some Comments on CP. *Technometrics*, 15(4), 661-675.
- McQuarrie, A., Robert, S., & Tsai, C.L. (1997). The Model Selection Criterion AICu. *Statistics and Probability Letters*, 34, 285-292.
- McQuarrie, A.D.R., & Tsai, C.L. (1998). *Regression and Time Series Model Selection*. Singapore : World Scientific.
- Montgomery, D.C., Peck, E.A., & Vining, G.G. (2006). *Introduction to Linear Regression Analysis*. (4th ed). New York : Wiley.
- Sheather, S.J. (2009). *A Modern Approach to Regression with R*. New York : Springer.
- Yanagihara, H., & Ohmoto, C. (2005). On Distribution of AIC in Linear Regression Models. *Journal of Statistical Planning and Inference*, 133, 417-433.